

Кольпоскопическая терминология шейки матки 2011 IFSCS

(Рио-де-Жанейро)

Общие положения		- Адекватная / Неадекватная кольпоскопия - оценка цервикса затруднена по причине: - воспаление, кровотечение, рубцы - Сквамозно-цилиндрический стык визуализируется: - полностью, частично, не визуализируется - Зона трансформации: - типы 1, 2, 3	
Нормальные кольпоскопические картины		- Оригинальный сквамозный эпителий: - Зрелый - Атрофический - Цилиндрический эпителий - Эктопия - Метапластический сквамозный эпителий - Наботовы кисты - Открытые железы - Децидуоз при беременности	
Аномальные кольпоскопические картины	Общие принципы	- Локализация поражения: - Внутри или вне зоны трансформации - Локализация поражения по условному циферблату - Размер поражения: - Цервикальные квадранты, занятые поражением, Процент поражения цервикса	
	Степень I (слабовыраженные изменения)	- Плоский ацето-белый эпителий - Неровная, географическая граница	- Нежная мозаика - Нежная пунктация
	Степень II (выраженные изменения)	- Плотный ацето-белый эпителий - Быстрое побеление - Открытые железы (крипты) с ободком	- Грубая мозаика - Грубая пунктация - Чёткая граница - Признак внутренней границы - Признак гребня
	Неспецифические	- Лейкоплакия (кератоз, гиперкератоз) - Эрозия - Окрашивание Люголем (Тест Шиллера): окрашивается / не окрашивается	
Подозрение на инвазию	- Атипические сосуды Дополнительные признаки: хрупкие сосуды, неровная поверхность, экзофитное поражение, некроз, изъязвление (некротическое), опухоль/макроскопическое новообразование		
Другие кольпоскопические картины	- Врожденная зона трансформации - Кондиломы - Полип (эктоцервикальный, эндоцервикальный) - Воспаление - Стеноз - Врожденные аномалии - Постлечебные изменения - Эндометриоз		